



手机扫一扫 边聊边爆料

奖金最低50元最高千元

新闻热线 3585000

鲁中晨报热线爆料群群管理员二维码



16日,阴有大雨局部暴雨并伴有雷电,南风2~3级,雷雨时阵风7~9级,24~28℃ / 17日,阴有大到暴雨转小到中雨并伴有雷电,东南风2~3级增强至3~4级,雷雨时阵风7~9级,24~29℃ / 18日,阴有小雨,东南风3~4级,24~31℃

淄博发布新冠病毒疫苗接种禁忌症确认定点医院名单 11家医院可诊查确认接种禁忌症

淄博7月15日讯 今天,记者从淄博市卫生健康委获悉,为做好全市新冠病毒疫苗接种禁忌症确认工作,淄博市发布了包括淄博市中心医院、张店区人民医院在内的11家新冠病毒疫苗接种禁忌症确认定点医院名单,方便群众正确识别禁忌症,让适宜人群放心接种,助推应接尽接工作。

具体就诊程序为:

对于患有急性疾病、患慢

性疾病的急性发作期或未控制的严重慢性病、妊娠期妇女等新冠病毒疫苗接种禁忌症明确的,由其所在单位或村(居)民委员会根据病历资料和诊断证明等进行确认。

对于新冠病毒疫苗接种禁忌症不能确定的,由其所在单位或村(居)民委员会安排相应人员与辖区定点医院电话预约后,按预约时间持有效身份证件及相关病历资料等到定点医院

院确认。

定点医院接诊医师依据国家卫健委《新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版)》对就诊人员进行诊查。需临床检查、检验确诊的,安排相应检查;需会诊的,安排相关专业医师会诊。

经诊查确认,具有明确新冠病毒疫苗接种禁忌症的,由主治医师在《淄博市新冠病毒疫苗接种禁忌症确认

表》中列出,填写结论,并签字、加盖单位公章,作为就诊人员本人新冠病毒疫苗接种禁忌的依据。

大众日报淄博融媒体中心记者 翟咏雪

相关链接

全国新冠疫苗接种剂次超14亿

国家卫生健康委7月14日发布的数据显示,截至13日,国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。在山东,截至11日24时,全省累计接种新冠病毒疫苗突破1亿剂次,5686.49万人完成第一剂次接种,4342.38万人完成全程接种,18岁以上人群接种比例突破70%,其中60岁及以上老年人接种比例突破50%。



扫描二维码查看医院名单

接种新冠病毒疫苗禁忌和注意事项指引

可以接种的情况

- 1.已知对尘螨、食物(鸡蛋、花生、海鲜、芒果)、花粉、酒精、青霉素、头孢或者其他药物过敏,可以接种。
- 2.患有心脏病、冠心病、冠状动脉粥样硬化等疾病,不是急性发作期,可以接种。
- 3.健康状况稳定,药物控制良好的慢性病人群不作为新冠病毒疫苗接种禁忌人群,建议接种。
- 4.高血压药物控制稳定,血压低于160/100mmHg,可以接种。
- 5.糖尿病药物控制稳定,空腹血糖 $\leq 13.9\text{mmol/L}$,无急性并发症(酮症酸中毒、高渗状态、乳酸酸中毒),可以接种。
- 6.甲状腺功能减退者服用稳定剂量左甲状腺素(优甲乐),甲功正常,可以接种。
- 7.慢性湿疹没有明显发作,且处于非治疗阶段,可以接种。
- 8.慢性荨麻疹当前症状不明显,且处于非治疗阶段,可以接种。
- 9.慢性鼻炎、慢性咽炎症状不明显,可以接种。
- 10.慢性肝炎非治疗阶段,肝功能正常,可以接种。
- 11.肺结核不是活动期,可以接种。
- 12.银屑病非脓疱型等急性类型,处于非治疗阶段,可以接种。
- 13.白癜风处于非治疗阶段,可以接种。
- 14.慢阻肺非急性发作期,无明显咳嗽,可以接种。
- 15.强直性脊柱炎无急性疼痛表现,且炎症指标无明显异常可以接种。
- 16.抑郁症药物控制良好,

- 生活工作如常,可以接种。
- 17.精神疾病患者,病情稳定,可以接种。
- 18.用于治疗糖尿病的各种药物(包括注射胰岛素),均不作为疫苗接种的禁忌。
- 19.免疫系统疾病(系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征等)总体原则是谨慎接种。一般情况下,在病情稳定时可以接种新冠灭活疫苗和重组亚单位疫苗。
- 20.恶性肿瘤术后超过三年,不再进行放化疗;肾癌综合征;肾移植后吃免疫抑制药物;艾滋病患者、HIV感染者,建议接种灭活疫苗或重组亚单位疫苗。
- 21.阴道炎、尿道炎等泌尿系统感染,无发热,处于非治疗阶段,可以接种。
- 22.单纯腹泻,无发热,每日不超过三次,可以接种。
- 23.心脏病、支架、搭桥、安装起搏器,术后恢复正常,可以接种。
- 24.器官移植术后,恢复良好,体征平稳,建议用新冠灭活疫苗。
- 25.脑梗塞治愈者或有后遗症(且病情稳定、血压控制平稳)者,可以接种。
- 26.阑尾炎术后、人工流产术后,身体恢复良好,没有其他不适的话,可以接种。
- 27.骨折、外伤,无感染发热,可以接种。
- 28.备孕期、哺乳期可以接种,哺乳期可以继续哺乳。
- 29.男性不存在因备孕不能接种新冠病毒疫苗的问题。
- 30.月经期可以接种。
- 31.侏儒症可以接种。

暂缓接种的情况

- 1.任何原因(感冒、伤口感染、局部炎症)引起的发热(腋下体温 $\geq 37.3\text{℃}$),暂缓接种。
- 2.痛风发作、重感冒、心梗、脑梗等疾病急性发作期,暂缓接种。
- 3.恶性肿瘤患者手术前后,正在进行化疗、放疗期间,暂缓接种。
- 4.头痛、头晕、恶心、呕吐、胸闷、胃部不适等,暂缓接种,查明原因再考虑是否接种。
- 5.荨麻疹发作期,有皮肤瘙痒症状,暂缓接种。
- 6.诺如病毒或其他病毒引起的急性腹泻,暂缓接种。

不可以接种的情况

- 1.患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者(如横贯性脊髓炎、格林巴利综合征、脱髓鞘疾病等),不能接种。
- 2.既往接种疫苗出现严重过敏反应者(如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等),不能接种。
- 3.对疫苗成分及辅料过敏者不能接种,灭活新冠病毒疫苗辅料主要包括:磷酸氢二钠、氯化钠、磷酸二氢钠、氢氧化铝。
- 4.正在发热者,或患急性疾病,或慢性疾病的急性发作期,或未控制的严重慢性病患者。
- 5.妊娠期妇女不能接种。
- 6.患血小板减少症或出血性疾病的,不能接种。



其他情况

- 1.接种后发现怀孕不需要终止妊娠,建议做好孕期检查和随访。
- 2.对于有备孕计划的女性,不必仅因接种新冠病毒疫苗而延迟怀孕计划。
- 3.新冠病毒疫苗不推荐与其他疫苗同时接种。其他疫苗与新冠病毒疫苗的接种间隔应大于14天。
- 4.任何情况下,当因动物致伤、外伤等原因需接种狂犬疫苗、破伤风疫苗、狂犬病免疫球蛋白、破伤风免疫球蛋白时,不考虑间隔,优先接种上述疫苗和免疫球蛋白。
- 5.如果先接种了狂犬疫苗、破伤风疫苗、狂犬病免疫球蛋白、破伤风免疫球蛋白等,需先完成上述疫苗最后一针接种,间隔14天后可以接种新冠病毒疫苗。
- 6.注射免疫球蛋白者应至少间隔1个月以上接种新冠病毒疫苗,以免影响疫苗免疫效果。
- 7.既往新冠肺炎病毒感染者(患者或无症状感染者),在充分告知基础上,可在6个月后接种1剂新冠病毒疫苗。
- 8.疫苗接种前无需开展新冠病毒核酸及抗体检测。
- 9.接种后不建议常规检测抗体作为免疫成功与否的依据。
- 10.现阶段建议用同一个疫苗产品完成接种。如遇当地疫苗无法继续供应或者异地接种等特殊情况,无法用同一个疫苗产品完成接种时,可采用相同种类的其他生产企业的疫苗产品完成接种。
- 11.新冠灭活疫苗需要接种2剂,未按免疫程序完成者,建议尽早补种。免疫程序无需重新开始,补种完成相应剂次即可。
- 12.新冠灭活疫苗在14-21天完成2剂接种的,无需补种。
- 13.现阶段暂不推荐加强免疫。新冠灭活疫苗按照免疫程序完成两剂次,不再加强。
- 14.其他情况请咨询接种点医生。
- 15.没有上臂人员,可以在大腿前外侧中部,肌肉注射。

据“疫苗中国”微信公众号